

DENTOHEXIN 0,2%

Streuli
pharma

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Was ist Dentohexin 0,2% und wann wird es angewendet?

Dentohexin wirkt gegen Bakterien und Pilze, die im Mund- und Rachenraum Entzündungen verursachen können.

Dentohexin dient zur Behandlung von entzündlichen und infektiösen Erkrankungen im Mund- und Rachenraum; wie zum Beispiel bei Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischbluten, Zahnbitterkrankungen, Aphthen und Prothesendruckstellen. Dentohexin wird vor und nach zahnärztlichen Eingriffen verwendet.

Daneben kann Dentohexin zur Unterstützung bei eingeschränkter Mundhygiene, zur Unterstützung der Kariesprophylaxe, bei Mundgeruch und Zahnbelag verwendet werden.

Wann darf Dentohexin 0,2% nicht eingenommen/angewendet werden?

Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Bei Geschwüren oder offenen Stellen mit Schleimhautablösungen im Mund.

Wann ist bei der Einnahme/Anwendung von Dentohexin 0,2% Vorsicht geboten?

Bei regelmässigem Gebrauch kann eine behebare Verfärbung der Zähne und Zunge auftreten. Dentohexin nicht in Auge oder Gehörgang bringen.

Chlorhexidin löst in sehr seltenen Fällen Allergien aus. Typische Zeichen sind Juckreiz, allgemeine Hautrötung, Nesselfieber, Asthma oder vereinzelt Kreislaufreaktionen. Beenden Sie sofort die Anwendung von Dentohexin und kontaktieren Sie umgehend Ihren Zahnarzt bzw. Ihre Zahnärztin oder Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin.

Längere Anwendung von Dentohexin sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Zahnarzt bzw. mit der Ärztin oder Zahnärztin erfolgen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an andern Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekauft!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Dentohexin 0,2% während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen/angewendet werden?

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Sie Dentohexin nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin anwenden.

Wie verwenden Sie Dentohexin 0,2%?

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren

Die Dentohexin-Lösung wird mit gleichen Teilen Wasser verdünnt.

Morgens und abends nach den Mahlzeiten, vorzugsweise 15 Min. nach dem Zähneputzen (Mund zwischen Zähneputzen und der Anwendung von Dentohexin gründlich mit Wasser spülen), mit je 5 ml Dentohexin-Lösung und 5 ml Wasser (s. Einteilung auf dem beiliegenden Messbecher) ca. 20 Sekunden lang spülen und gurgeln. Lösung ausspucken, nicht schlucken oder nachspülen.

Bei Prothesen-Entzündungen die Prothese reinigen und anschliessend während 5 Minuten in unverdünnte Dentohexin-Lösung einlegen. Mund zusätzlich wie oben beschreiben spülen.

Bei Kindern und Jugendlichen ist die Behandlung zahnärztlich oder ärztlich in halbjährlichem Abstand zu überprüfen. Die Anwendung und Sicherheit bei Kindern unter 6 Jahren ist bisher nicht geprüft worden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt/Zahnarzt bzw. von der Ärztin/Zahnärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt/Zahnarzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin/Zahnärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Dentohexin 0,2% haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Dentohexin auftreten:

Häufig (betrifft 1 bis 10 von 100 Anwendern)

Eine gelbliche, manchmal auch dunklere Verfärbung der Zähne und Füllungen wurde bei langfristiger Anwendung häufig beobachtet. Durch gründliches Zähneputzen mit einer reinigenden Zahnpasta vor der Anwendung mit Dentohexin kann diese Verfärbung weitgehend verhindert werden. In Ausnahmefällen müssen die Zähne von einem Fachmann gereinigt werden.

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1000 Anwendern)

Störungen der Geschmacksempfindung oder Taubheitsgefühl der Zunge.

Selten (betrifft 1 bis 10 von 10 000 Anwendern)

Selten treten Überempfindlichkeitsreaktionen (gerötetes, schmerzhaftes Zahnfleisch, allergische Reaktionen der Haut, Schleimhäute und Atmungsorgane) auf (siehe «Wann ist bei der Anwendung von Dentohexin 0,2% Vorsicht geboten?»). In Einzelfällen wurden auch schwerwiegende allergische Reaktionen nach lokaler Anwendung von Chlorhexidin beschrieben.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

DENTOHEXIN 0,2%

Streuli
pharma

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Was ist Dentohexin 0,2% und wann wird es angewendet?

Dentohexin wirkt gegen Bakterien und Pilze, die im Mund- und Rachenraum Entzündungen verursachen können.

Dentohexin dient zur Behandlung von entzündlichen und infektiösen Erkrankungen im Mund- und Rachenraum; wie zum Beispiel bei Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischbluten, Zahnbitterkrankungen, Aphthen und Prothesendruckstellen. Dentohexin wird vor und nach zahnärztlichen Eingriffen verwendet.

Daneben kann Dentohexin zur Unterstützung bei eingeschränkter Mundhygiene, zur Unterstützung der Kariesprophylaxe, bei Mundgeruch und Zahnbelag verwendet werden.

Wann darf Dentohexin 0,2% nicht eingenommen/angewendet werden?

Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Bei Geschwüren oder offenen Stellen mit Schleimhautablösungen im Mund.

Wann ist bei der Einnahme/Anwendung von Dentohexin 0,2% Vorsicht geboten?

Bei regelmässigem Gebrauch kann eine behebbare Verfärbung der Zähne und Zunge auftreten. Dentohexin nicht in Auge oder Gehörgang bringen.

Chlorhexidin löst in sehr seltenen Fällen Allergien aus. Typische Zeichen sind Juckreiz, allgemeine Hautrötung, Nesselfieber, Asthma oder vereinzelt Kreislaufreaktionen. Beenden Sie sofort die Anwendung von Dentohexin und kontaktieren Sie umgehend Ihren Zahnarzt bzw. Ihre Zahnärztin oder Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin.

Längere Anwendung von Dentohexin sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Zahnarzt bzw. mit der Ärztin oder Zahnärztin erfolgen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an andern Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekauft!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Dentohexin 0,2% während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen/angewendet werden?

In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Sie Dentohexin nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin anwenden.

Wie verwenden Sie Dentohexin 0,2%?

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren

Die Dentohexin-Lösung wird mit gleichen Teilen Wasser verdünnt.

Morgens und abends nach den Mahlzeiten, vorzugsweise 15 Min. nach dem Zähneputzen (Mund zwischen Zähneputzen und der Anwendung von Dentohexin gründlich mit Wasser spülen), mit je 5 ml Dentohexin-Lösung und 5 ml Wasser (s. Einteilung auf dem beiliegenden Messbecher) ca. 20 Sekunden lang spülen und gurgeln. Lösung ausspucken, nicht schlucken oder nachspülen.

Bei Prothesen-Entzündungen die Prothese reinigen und anschliessend während 5 Minuten in unverdünnte Dentohexin-Lösung einlegen. Mund zusätzlich wie oben beschrieben spülen.

Bei Kindern und Jugendlichen ist die Behandlung zahnärztlich oder ärztlich in halbjährlichem Abstand zu überprüfen. Die Anwendung und Sicherheit bei Kindern unter 6 Jahren ist bisher nicht geprüft worden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt/Zahnarzt bzw. von der Ärztin/Zahnärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt/Zahnarzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin/Zahnärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Dentohexin 0,2% haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Dentohexin auftreten:

Häufig (betrifft 1 bis 10 von 100 Anwendern)

Eine gelbliche, manchmal auch dunklere Verfärbung der Zähne und Füllungen wurde bei langfristiger Anwendung häufig beobachtet. Durch gründliches Zähneputzen mit einer reinigenden Zahnpasta vor der Anwendung mit Dentohexin kann diese Verfärbung weitgehend verhindert werden. In Ausnahmefällen müssen die Zähne von einem Fachmann gereinigt werden.

Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1000 Anwendern)

Störungen der Geschmacksempfindung oder Taubheitsgefühl der Zunge.

Selten (betrifft 1 bis 10 von 10 000 Anwendern)

Selten treten Überempfindlichkeitsreaktionen (gerötetes, schmerzendes Zahnfleisch, allergische Reaktionen der Haut, Schleimhäute und Atmungsorgane) auf (siehe «Wann ist bei der Anwendung von Dentohexin 0,2% Vorsicht geboten?»). In Einzelfällen wurden auch schwerwiegende allergische Reaktionen nach lokaler Anwendung von Chlorhexidin beschrieben.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15–25 °C) und ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt/Zahnarzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin/Zahnärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Dentohexin 0,2% enthalten?

1 ml Konzentrat zur Herstellung einer Lösung für die Mundhöhle enthält:

Wirkstoffe

Chlorhexidini digluconas 2 mg,

Hilfsstoffe

Glycerolum (85 per centum), Polysorbatum 20, Menthae piperitae aetherolum, Rosae aetherolum, Cinnamomi aetherolum, Anisi aetherolum, E 127 (Erythrosin), Aqua purificata.

Zulassungsnummer

50174 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Dentohexin 0,2%?

Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung. Lösung (mit Messbecher) zu 100 ml, 200 ml und 1000 ml.

ZulassungsinhaberIn

Streuli Pharma AG, 8730 Uznach

Diese Packungsbeilage wurde im August 2020 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

DENTOHEXINE 0,2%



Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Qu'est-ce que Dentohexin 0,2% et quand doit-il être utilisé?

Dentohexin agit contre les bactéries et les champignons qui peuvent déclencher des inflammations dans la cavité buccale et pharyngée.

Dentohexin est indiqué dans le traitement des affections inflammatoires et infectieuses de la région buccale et pharyngée telles que les inflammations gingivales, le saignement des gencives, les affections parodontales, les aphtes et les points de compression provoqués par une prothèse. Dentohexin est utilisé avant et après une intervention dentaire.

Dentohexin peut également être utilisé pour pallier à un manque d'hygiène buccale, pour renforcer la prophylaxie des caries, en cas de mauvaise haleine et de plaque dentaire.

Quand Dentohexin 0,2% ne doit-il pas être pris/utilisé?

Dentohexin ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à un des constituants. En cas d'ulcères et de lésions avec détachements de la muqueuse buccale.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de Dentohexin 0,2%?

Si le produit est utilisé pendant une période prolongée, on peut observer une coloration des dents et de la langue qui disparaît après l'arrêt de Dentohexin. Ne pas appliquer Dentohexin dans l'oeil ou dans le conduit auditif. Très rarement, la chlorhexidine peut déclencher des réactions allergiques qui se caractérisent typiquement par des démangeaisons, une rougeur généralisée de la peau, une urticaire, de l'asthme ou, dans des cas isolés, des réactions circulatoires. Arrêtez immédiatement l'utilisation de Dentohexin et consultez sans tarder votre médecin ou dentiste.

Dentohexin ne doit être utilisé de façon prolongée qu'après en avoir référé au médecin/dentiste.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste

- si vous souffrez d'une autre maladie,
- si vous êtes allergique ou
- si vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Dentohexin 0,2% peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Durant la grossesse ou l'allaitement, Dentohexin ne doit être utilisé que sur avis médical.

Comment utiliser Dentohexin 0,2%?

Adultes et enfants à partir de 6 ans

La solution de Dentohexin est diluée avec un volume équivalente d'eau.

Le matin et le soir, après les repas, de préférence 15 minutes après le brossage des dents (rincer soigneusement la bouche avec de l'eau entre le brossage des dents et l'utilisation de Dentohexin), rincer la bouche et gargariser pendant 20 secondes avec 5 ml de solution de Dentohexin solution, diluée dans 5 ml d'eau (voir la graduation sur le gobelet doseur fourni). Recrachter la solution, ne pas l'avaler ni procéder à un rinçage complémentaire.

En cas d'inflammation liée à une prothèse dentaire, nettoyer la prothèse et la placer ensuite pendant 5 minutes

dans la solution non diluée de DentoheXine. Rincer en outre la bouche selon les indications susmentionnées.

Chez les enfants et adolescents, le traitement doit être contrôlé par un dentiste ou un médecin à intervalles de 6 mois.

L'utilisation et la sécurité d'emploi n'ont pas été contrôlées jusqu'à présent chez les enfants âgés de moins de 6 ans. Veuillez vous conformer au dosage indiqué sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin/dentiste. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin/dentiste, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires DentoheXine 0,2% peut-il provoquer?

L'utilisation de DentoheXine peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Un coloration jaunâtre, parfois plus foncée des dents et des amalgames a été observée commune dans l'utilisation à long terme dans certains cas. Un brossage intensif avec une pâte dentifrice nettoyante avant l'utilisation de la solution de DentoheXine permet généralement d'éviter cette coloration. Il arrive exceptionnellement qu'un nettoyage des dents par un spécialiste soit nécessaire.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

troubles du goût ou une sensation d'engourdissement de la langue.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)

Dans des rares cas, des réactions d'hypersensibilité ont été observées (gencives rougies et douloureuses, réactions allergiques de la peau, des muqueuses et du système respiratoire) (voir aussi «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de DentoheXine 0,2%?»). Des cas isolés de réactions allergiques graves après l'utilisation locale de chlorhexidine ont aussi été décrits.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25°C) et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin/dentiste, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient DentoheXine 0,2%?

1 ml de solution à diluer buccale contient

Principes actifs

digluconate de chlorhexidine 2 mg

Excipients

glycérol à 85 pour cent, polysorbate 20, huile essentielle de menthe, huile essentielle de rose, huile essentielle de cannelle, huile essentielle d'anisi, E 127 (érythrosine), eau purifiée

Numéro d'autorisation

50174 (Swissmedic)

Où obtenez-vous DentoheXine 0,2%? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans prescription médicale. Solution (avec mesurette) de 100 ml, 200 ml et de 1000 ml.

Titulaire de l'autorisation

Streuli Pharma SA, 8730 Uznach

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en août 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

DENTOHEXIN 0,2%



Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Che cos'è DentoheXin 0,2% e quando si usa?

DentoheXin agisce contro batteri e funghi, che possono causare infiammazioni nella bocca e nella faringe.

DentoheXin serve per trattare malattie infiammatorie e infettive nella bocca e nella faringe; come per esempio nelle infiammazioni alle gengive, emorragia gengivale, malattie del parodonto, afte e posti di pressione della protesi.

DentoheXin viene usato prima e dopo un intervento dentistico.

Oltre a ciò DentoheXin può essere usato per supportare l'igiene della bocca, la prevenzione della carie, e in caso di alito cattivo e placca dentale.

Quando non si può assumere/usare DentoheXin 0,2%?

In caso di ipersensibilità ad uno dei componenti. In caso di ulcere o lesioni della mucosa nella bocca.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di DentoheXin 0,2%?

In caso di uso regolare, una colorazione reversibile dei denti e della lingua può apparire. Non applicare DentoheXin negli occhi o nei canali auditivi.

In casi molto rari la clorexidina provoca delle allergie. Segnali tipici comprendono prurito, arrossamento cutaneo generale, orticaria, asma oppure, in casi isolati, reazioni circolatorie. Interrompa subito l'utilizzo di Dentohexin e contatti immediatamente il suo dentista o il suo medico.

L'uso prolungato di Dentohexin deve soltanto aver luogo dopo aver consultato il medico o la dentista.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Dentohexin 0,2% durante la gravidanza o l'allattamento?

Dentohexin può essere usato durante la gravidanza o l'allattamento solo dopo aver consultato il suo medico.

Come usare Dentohexin 0,2%?

Adulti e bambini a partire da 6 anni

Dentohexin viene diluito con acqua in parti uguali.

Mattina e sera dopo i pasti, di preferenza 15 minuti dopo aver pulito i denti (risciacquare accuratamente la bocca con acqua nel periodo tra il lavaggio dei denti e l'uso di Dentohexin), sciacquare la bocca e fare dei gargarismi per circa 20 secondi con 5 ml di Dentohexin diluiti in 5 ml d'acqua (vedere graduazione sulla misura per dosaggio, inclusa). Sputare la soluzione, non ingoiare o risciacquare.

In caso d'infezioni dovute a protesi, pulire la protesi ed infine immergerla per 5 minuti in Dentohexin non diluito. Oltre a ciò sciacquare la bocca come descritto sopra.

Il medico o il dentista controlleranno il trattamento nei bambini o adolescenti in un intervallo di 6 mesi.

L'uso e la sicurezza nei bambini sotto i 6 anni non sono stati ancora testati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico/dentista. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico/dentista, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Dentohexin 0,2%?

Con l'applicazione di Dentohexin possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

In alcuni casi uno scolorimento giallastro, a volte più scuro dei denti e delle otturazioni è stato comunemente osservato dopo un uso a lungo termine. Quest'effetto è ampiamente evitabile pulendo a fondo i denti con un dentifricio ad azione pulente prima dell'uso di Dentohexin soluzione. In casi eccezionali è necessario ricorrere alla pulizia di uno specialista.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

disturbi della percezione del gusto oppure un senso di parestesia della lingua

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10 000)

Raramente si manifestano reazioni di ipersensibilità (gengive arrossate e dolenti, reazioni allergiche della pelle, delle mucose e degli organi respiratori) (vedi «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Dentohexin 0,2%?»).

In casi isolati sono state descritte anche gravi reazioni allergiche dopo l'utilizzo locale di clorexidina.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C) e fuori della portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il dentista, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Dentohexin 0,2%?

1 ml di concentrato per soluzione per mucosa orale contenente

Principi attivi

2 mg di clorexidina digluconato

Sostanze ausiliarie

Glicerolo (85 %), polisorbato 20, olio essenziale di menta piperita, olio essenziale di rosa, olio essenziale di cinnamomo, olio essenziale di anice, E 127 (eritrosina), acqua purificata.

Numero dell'omologazione

50174 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Dentohexin 0,2%?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Soluzione (con misurino) da 100 ml, 200 ml e 1000 ml.

Titolare dell'omologazione

Streuli Pharma SA, 8730 Uznach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel agosto 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).